



à

LEXIQUE DE

SÉMILOGIE

Elodie Deline infirmière

Patrick Richardson cadre de santé

établissement
public de santé de
Ville-Evrard
spécialisé en santé mentale
Seine-Saint-Denis

PROJET D'ÉTABLISSEMENT
2013 • 2017
PROJET DE SOINS

INTRODUCTION

Etre infirmier en psychiatrie nécessite de connaître les maladies mentales, leur description et formes cliniques, leur diagnostic, évolution et traitement.

Rédigé par des soignants de l'établissement de Ville-Evrard pour des soignants, ce lexique de sémiologie psychiatrique répertorie plus de 200 signes cliniques, symptômes et syndromes observés au cours des troubles psychiques. Il vient en appui de la formation « *comment s'approprier un vocabulaire sémiologique professionnel dans sa pratique* ».

Rigueur du vocabulaire, précision des descriptifs et lisibilité des contenus en font toute sa richesse et son utilité.

Conçu dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soins 2013-2017, dont un des axes est consacré au renforcement des compétences, cet outil a été communiqué dans un premier temps dans les unités de soins. Cette nouvelle édition, en format poche, vise une diffusion élargie et une appropriation facilitée par la possibilité d'annotations personnelles.

Bonne lecture.

*Nadine Chastagnol
Coordonnatrice générale des soins
Direction des soins EPS Ville-Evrard*

A

ABOULIE

Etre indécis, incapable de faire des projets

AKATHISIE OU ACATHISIE

Impatience, syndrome des jambes sans repos, impossibilité de rester en place (par exemple, effets secondaires fréquents de certains neuroleptiques)

ACCÈS HYPOMANIAQUE

Etat maniaque dont les symptômes restent modérés

ACHATS INCONSIDÉRÉS

Achats démesurés et inadaptés en regard de ses moyens

ADHÉSION AU DÉLIRE

Conviction délirante (dite inébranlable)

AFFABULATION

Récit mensongé (inventé) plus ou moins simple ou complexe et plus ou moins arrangé

AFFECT

Tonalité du sentiment : agréable ou désagréable

AFFECTION EXHIBÉE

Elégance exagérée

AGITATION MOTRICE

Début de nombreuses actions sans les achever (bricolage, commence tout et finit rien), ne peut tenir en place, bouge sans cesse

AGNOSIE

Trouble de la reconnaissance de l'environnement, ne reconnaît pas ce qu'il voit, touche, entend ...

AGRAMMATISME

Langage qui ressemble à un style télégraphique

AGRESSIVITÉ

Représente à la fois la violence sur soi (auto agressivité), la violence sur autrui (hétéro-agressivité) et/ou sur les objets

AKINÉSIE

Diminution de la mobilité (par exemple, maladie de Parkinson)

AMBIVALENCE

Discours permettant au patient d'exprimer dans le même temps des sentiments ou des idées totalement opposés (les idées sont contradictoires)

AMNÉSIE DE FIXATION OU ANTÉROGRADE

Incapacité d'évoquer ou de se rappeler les évènements récents

AMNÉSIE HYSTÉRIQUE

Se présente sous forme d'amnésie lacunaire souvent remplacée par des faux souvenirs

AMNÉSIE RÉTROGRADE

Les souvenirs les plus anciens restent persistants

AMNÉSIE ANTÉRORETROGRADE

Incapacité d'évoquer et de se souvenir d'évènements récents et anciens

AMNÉSIE LACUNAIRE

Amnésie de faits passés consécutif à un trouble de la conscience (traumatisme, confusion, épilepsie...)

ANAMNÈSE

Ensemble des renseignements donnés par le patient et son entourage sur les circonstances d'apparition de la maladie

ANESTHÉSIE AFFECTIVE

Incapacité à ressentir les affects (joie ou tristesse)

ANGOISSE

Etat d'anxiété paroxystique sans objet, subjective, qui entraîne un état d'hyper vigilance douloureuse associé à des signes somatiques et neurovégétatifs

ANHÉDONIE

Ne plus prendre plaisir à faire des choses

ANOREXIE

Manque d'appétit, absence ou diminution de l'alimentation, perte de la sensation de faim

ANOREXIE MENTALE

Principalement chez les jeunes filles entre 12 et 20 ans

Règles des trois A: (conduite active de restriction alimentaire)

- Anorexie

- Amaigrissement (souvent supérieur à 25% du poids)

- Aménorrhée (dans plus de 75% des cas)

ANXIÉTÉ

Sensation de vigilance douloureuse avec appréhension d'un danger

APATHIE

Etat d'indolence, indifférence, nonchalance, entraînant une lenteur à agir

APHASIE

Perte partielle ou totale de la parole dû le plus souvent à un trouble neurologique

APRAGMATISME

Se traduit par l'incapacité d'accomplir et de réaliser les actes de la vie quotidienne.

APRAXIE

Incapacité d'exécuter un acte volontaire adapté (par exemple, impossibilité d'enfiler de façon adaptée un pantalon de pyjama)

ATHYMHORMIE

Diminution ou perte de l'affectivité et de l'élan vital.

ATTAQUE DE PANIQUE

Crise d'angoisse paroxystique (dans la névrose d'angoisse par exemple ou dans un trouble phobique)

ATTITUDE D'ÉCOUTE

L'attention du sujet est attirée et détournée par une hallucination auditive. Le sujet tend l'oreille pour écouter l'hallucination.

AUTISME

Fait partie de Troubles envahissants du développement

AUTOPHAGIE

Le patient s'inflige une douleur ; se mord ou mange une partie de son corps. Forme d'automutilation.

AUTOMUTILATION

Se caractérise par des blessures sans intention suicidaire que le patient s'inflige volontairement (par exemple scarifications)

B

BAISSE DE LA LIBIDO

Diminution du désir, anaphrodisie (perte de l'appétit sexuel)

BARRAGE

Brusque interruption du discours ou de l'activité psychomotrice liée à un trouble profond de la pensée

BDA

Bouffée Délirante Aigue

BÉGALEMENT

Trouble du langage : Difficulté à émettre certains sons ; exagéré par les émotions, apparait dans l'enfance

BIPOLAIRE

Se dit d'un trouble de l'humeur chronique (anciennement PMD ; Psychose Maniaco Dépressive)

BORDERLINE

Synonyme d'état limite ; trouble de la personnalité qui désigne un état frontière entre « l'organisation névrotique et psychotique »

BOULIMIE (syndrome)

Ingestion impulsive et incoercible d'une grande quantité de nourriture associée à un sentiment de culpabilité

BRADYKINÉSIE

Ralentissement moteur.

BRADYPHÉMIE

Débit verbal lent voire mutisme

BRADYPSYCHIE OU BRADYLALIE

Lenteur d'idéation

BRUXISME

Grincement des dents



CATALEPSIE

Disparition de l'activité motrice avec rigidité particulière, le sujet est immobile mais la mobilisation passive reste possible et le patient garde la position (on dit qu'il garde l'attitude imposée), en cas de résistance à la mobilisation passive avec hypertonie franche = évoquer l'hystérie
Dans la schizophrénie, la catalepsie est un symptôme de la forme catatonique.

CATAPLEXIE

Perte brutale du tonus musculaire avec sensation d'une grande fatigue, ptose palpébrale dysarthrie (syndrome de Gelineau)

CAUCHEMARS

Rêve terrifiant avec peur et anxiété qui réveille le sujet (c'est une activité onirique)

CLAUSTROPHOBIE

Peur des se trouver dans un endroit clos, qui peut provoquer un sentiment d'angoisse plus ou moins intense.

CLEPTOMANIE

(ou Kleptomanie) Vol pathologique

CLINOPHILIE

Passé de nombreuses heures sur son lit

COLÈRE

Réaction émotive paroxystique se manifestant par une agitation verbale et gestuelle

COMPULSION

Tendance impérative à accomplir un acte ou à penser à une idée qu'il réproouve consciemment. (lavage des mains, calcul mental, rangements ...) En lien direct avec l'obsession dans les T.O.C

CONDUITE À RISQUE

(fréquent chez les adolescents)

Adopter une activité délibérée non pathologique comportant un risque existant, mésestimé, et inadapté (exemple : 1ère rapport sexuel sans protection, consommation de grande quantité d'alcool dans un délai très courts = beach-drinking).

CONFUSION

Désorganisation de l'état de conscience, le patient est désorienté dans le temps, dans l'espace, amnésie de fixation et post critique ; toutes ses fonctions cognitives peuvent être atteintes.

CONSCIENCE

L'état de conscience est usité pour évaluer l'état de vigilance

CONVERSION

Syndrome de conversion, se voit dans l'hystérie : consiste à présenter un symptôme physique sans réalité organique

COPROPHAGIE

Ingestion d'excréments

COQ À L'ÂNE

Troubles des associations, enchaîne de façon inattendue les sujets sans qu'il y ait de liens entre eux

Crise clastique Situation de violence importante avec activité de destruction sans but précis (fureur et crise clastique sont des formes de colère pathologiques)

CRISE D'ANGOISSE OU ATTAQUE DE PANIQUE

Accès brutal d'angoisse très aiguë qui provoque soit une sidération soit une agitation motrice accompagnée de manifestations somatiques et neurovégétatives



DÉBRAILLÉ

Tenue vestimentaire désadapté

DÉLIRE (1)

Dérailler, sortir du sillon, trois caractères spécifiques :

- une conviction plus ou moins intense
- une dimension d'évidence interne et personnelle (certitude subjective inébranlable non partagée par le groupe)
- le contenu est impossible

= c'est une construction intellectuelle non réelle mais avec elle, le sujet apporte une croyance le plus souvent inébranlable.

DÉLIRE (2)

Le délire se décline selon quatre axes :

1. Le mécanisme : Les interprétations, les impressions corporelles, les intuitions, les illusions, les hallucinations
2. Les thèmes délirants : persécution, grandeur, influence (se sentir téléguidé, manipulé, envouté, influencé), hypochondriaques, négations d'organes
3. Vécu délirant, adhérence au délire plus ou moins importante, sthénicité plus ou moins marquée
4. Systématisation du délire : il faut évaluer la cohérence du délire, la solidité de l'enchaînement, sa description, la convainçance qui oriente vers la paranoïa.

Le délire mal systématisé, difficile à décrire avec des idées s'enchaînant mal les unes avec les autres, oriente vers le délire schizophrénique

DÉMONOMANIE

Délire à thème religieux, le patient a la conviction d'être possédé et la crainte de l'enfer et du démon

DÉPERSONNALISATION/DÉRÉALISATION

Sentiment de ne plus être soi-même, sensation de modification de l'ambiance, de la réalité et d'étrangeté.

DÉPRESSION HOSTILE

Les symptômes persécutif et sensitifs sont au premier plan

DÉPRESSION MASQUÉE

Les plaintes somatiques sont au premier plan

DÉPRESSION RÉACTIONNELLE

Etat dépressif en lien avec un évènement (divorce, ruine...)
Déshydratation Perte d'eau et/ou de sels minéraux liée à la perte de la sensation de soif, à l'hypersudation ou à la perte de liquide biologique (selles, urines, vomissements)

DÉSINHIBITION

Perd le sens de la réserve et de la pudeur (se déshabille sur la voie publique).

DÉSORIENTATION TEMPORO-SPATIALE

Incapacité à se repérer dans l'espace et dans le temps (dans les états confusionnels et/ou démentiels)

DIFFLUENCE

Pensée totalement anarchique rendant illogique et incohérente le discours

DIPSOMANIE

Consommation impulsive d'importantes quantités d'alcool de façon discontinue

DISCORDANCE

Symptôme rencontré dans la schizophrénie dans lequel il y a inadéquation entre la pensée exprimée, le ton et la mimique qui l'accompagne

DISSOCIATION

Perte de l'association des différentes instances telles que l'affectivité, la volonté, les fonctions intellectuelles, les capacités de raisonnement et de synthèse, l'harmonie et l'unité entre les différentes composantes de la vie psychique

DISTORSION TEMPORELLE

Modification de la perception du temps qui s'écoule

DIVINEMENT DE LA PENSÉE

Le sujet a la sensation que tout le monde sait ce qu'il pense

DOULEUR MORALE

Ensemble de symptômes retrouvés dans la dépression :

- culpabilité (« c'est de ma faute »)
- pleurs, tristesse
- autodévalorisation (« je ne vauds rien, je suis nulle »)
- pessimisme (« de toute façon, rien ne peut s'arranger, ça va toujours mal »)
- anticipation négative (« je ne pourrais jamais y arriver »)
- indignité, être indigne (« je ne mérite que d'être puni, je ne suis pas à la hauteur »)
- ruminations (« les idées me tourment en permanence dans la tête, je n'arrête pas d'y penser »)

DROMOMANIE

Impulsion irrésistible à marcher, parfois à courir

DYSKINÉSIES (précoce et tardive)

Mouvements anormaux involontaires d'amplitude variable, d'intensité plus ou moins grande, localisé ou généralisé.

Par ex :- Bucco lingual

- Effets secondaires des neuroleptiques

- Effets secondaires de la L.Dopa

DYSMORPHOPHOBIE

Inquiétude concernant son apparence corporelle

DYSORTHOGRAPHIE

Difficulté dans l'apprentissage de l'orthographe

DYSPAREUNIE

Douleur à la pénétration vaginale



ECHO DE LA PENSÉE

Hallucination accoustico-verbale avec certitude, de la part du patient, d'entendre une ou plusieurs voix intérieures répétant et commentant sa propre pensée comme un écho. (« on répète ma pensée »).

ECHOLALIE

Répète le dernier mot ou la fin de la phrase

ECHOMIMIE

Reproduit le mouvement en tout ou partie

ECHOPHRASIE

Synonyme d'écholalie : la personne répète les mots ou les paroles prononcés devant lui

ECHOPRAXIE

Reproduit le geste en tout ou partie, ou tentative de répétition pour imiter un geste accompli

ECMNÉSIE

Sentiment de déjà vécu

EJACULATION PRÉCOCE

Ejaculation trop rapide parfois quasi instantanée

EMOTION

Ensemble des sentiments éprouvés par un individu

EMOUSSEMENT AFFECTIF

Abrasion de l'affect, (par exemple chez le dément ou contention émotionnelle chez l'obsessionnel ou le patient déprimé)
Indifférence à des sollicitations habituellement plaisantes
(Proche de l'athymhormie)

ENCOPRÉSIE

Élimination fécale involontaire souvent diurne chez un enfant de plus de 4 ans

ENURÉSIE

Miction complète active et involontaire le plus souvent la nuit, plus fréquent chez le garçon, pathologie peu grave disparaissant en général à la puberté

ETAT CRÉPUSCULAIRE

Bref épisode de désordre psychotique évoquant un syndrome confusionnel

ETAT MANIAQUE

Trouble de l'humeur dont les symptômes sont opposés à la dépression, Grande exaltation

ETAT MIXTE

Troubles de l'humeur où se côtoient des éléments maniaques et dépressifs.

EUPHORIE

Normale en réaction à un événement heureux et positif

EUPHORIE

Important sentiment de joie et de gaieté

EUPHORIE EXPANSIVE

S'observe dans un contexte d'hyperactivité psychomotrice (troubles bipolaires par exemple)

EUPHORIE NIAISE

État d'euphorie inadapté, admiratif, associé à un ralentissement psychique (par exemple, démence frontale)

EXALTATION DE L'HUMEUR

On dit également élation : humeur trop gaie en décalage avec la situation

EXCLUSION

Synonyme de : Isolement, marginalisation, bannissement, désocialisation

EXTRAVAGANCE

Présentation d'allure excentrique



FABULATION

Production imaginaire non réelle vécue par le sujet (souvent conduit à la mythomanie)

FADING

Arrêt progressif du cours de la pensée, le discours se ralentit progressivement pour s'arrêter

FAUSSETÉ DU JUGEMENT

Chez un paranoïaque, raisonnement logique à partir d'un postulat fondamental qui est faux qui conduit à des conclusions erronées.

FROIDEUR SCHIZOPHRÉNIQUE

Défaut ou absence d'émotivité

FUGUE

Déambulation, errance, migration, vagabondage...

Le sujet quitte brutalement son foyer ou son environnement habituel

FUITE DES IDÉES

Commence une phrase, enchaîne les idées, en perdant le fil de départ (enchaînement rapide des idées sans lien apparent)(coqs à l'âne)

FUREUR

Forme extrême de colère

G

GÂTISME

Incontinence chez l'adulte due à une dégradation mentale

GLOSSOLALIE

Langage inventé, vocabulaire et syntaxe

GLOUTONNERIE (voracité)

Avidité à manger rapidement et par excès (se rencontre plutôt chez le patient arriéré)

GRAPHORRHÉE

Ecrit beaucoup

H

HALLUCINATION

Expérience erronée perceptuelle ressentie à l'état de veille dont le sujet est convaincu de la réalité

HALLUCINATION HYPNAGOGIQUE

Hallucination à l'endormissement

HALLUCINATION HYPNOPOMPIQUE

Hallucination au réveil

HALLUCINATIONS AUDITIVES (acoustico-verbales)

Certitude d'entendre une voix, un bruit, venant de l'extérieur mais qui n'existe pas

HALLUCINATIONS CÉNESTHÉSIQUES

Le sujet ressent une douleur, une brûlure, des paresthésies etc. . . sans aucun support organique (fréquent dans l'hypochondrie, ou hallucinatoire chez certains patients délirants)

HALLUCINATIONS VISUELLES

Perception et visualisation d'un objet inexistant (doit toujours orienter vers une pathologie organique)

HALLUCINOSE

Hallucination vespérale le plus souvent acoustico-verbale dont le sujet est conscient et qu'il critique (hallucinoze du buveur)

HÉBÉTUDE

Le patient suspend ou arrête toute activité physique ou psychique, précède la stupeur ;

HERMÉTISME

Impression d'impénétrabilité ressentie au contact d'un malade schizophrène (son discours est illogique, on ne comprend rien)

HISTRIONISME

Expression exagérée, démonstrative et théâtrale de son ressenti.

HYPERACTIVITÉ

Augmentation sensible de l'activité motrice, souvent associée à une difficulté de concentration (THADA)

HYPERÉMOTIF

Réaction émotionnelle exagérée

HYPERHÉDONIE

Plaisir exagéré dans toute activité

HYPERMIMIE

Visage hyper expressif

HYPERMNÉSIE

Exaltation de la mémoire. Mémoire prodigieuse

HYPERPHAGIE

Absorption compulsive excessive en une à deux heures sans faim d'une importante quantité de nourriture sans préoccupation de poids, hyperactivité physique, prise de laxatifs et vomissements provoqués (ce qui la distingue de la boulimie). La personne a l'impression de ne pas avoir le contrôle de cette prise alimentaire et n'arrive pas à l'arrêter.

HYPERPROSEXIE

Augmentation exagérée de l'attention (chez les sujets anxieux)

HYPERSEXUALITÉ

Nécessité de rapports sexuels fréquents souvent en lien avec un relâchement de la censure morale et éthique (addiction)

HYPERSOMNIE

Sommeil prolongée au-delà du temps normal nécessaire au repos

HYPERSUDATION

Transpiration importante et anormale

HYPERSYNTONE

Humeur particulièrement sensible à l'ambiance

HYPOCHONDRIE

Crainte ou conviction d'une atteinte de l'intégrité de sa santé ou de son corps

HYPOMIMIE

Diminution des mouvements du visage et de l'expressivité

HYPOPROSEXIE

Incapacité à se concentrer sur un travail

HYPOSYNTONE

Manque de contact relationnel



IDÉATION SUICIDAIRE

Pense plus ou moins intensément à la manière de mettre fin à ses jours

IDÉES FIXES POST-ONIRIQUES

Idées fixes résiduelles après un épisode confusionnel (onirisme)

IDÉES PARASITES

Idées qui envahissent le champ de la conscience et qui orientent le cours de la pensée

ILLUSIONS

Perception déformée d'un « objet » réel

IMPUDEUR

Ne tient pas compte des codes des conduites sociétales (se promène nu, perd totalement le sens de la honte)

IMPUISSANCE

Impossibilité ou difficulté d'avoir une érection

IMPULSION

Tendance irrésistible à l'accomplissement d'un geste, d'un acte, ayant un caractère dangereux ou incongru

IMPULSION VERBALE

Expression incoercible de mots, s'ils sont grossiers (coprolalie) symptomatique de la maladie Gilles de la Tourette

IMV

Intoxication Médicamenteuse Volontaire (fait d'ingérer volontairement une quantité de médicaments avec ou sans désir de mort)

INADÉQUATION DE L'ÉMOTIVITÉ

Décalage entre l'affect et le discours (par exemple, discordance du schizophrène)

INCURIE

Négligence corporelle (ne fait pas sa toilette)

INHIBITION MOTRICE

Ralentissement psychomoteur (bradykinésie) à la fois ralentissement de la pensée et de la capacité d'exécution

INSOMNIE REBELLE

Impossibilité de trouver le sommeil malgré un traitement adapté

INSOMNIES

Réveils précoces, réveils fréquents, insomnie d'endormissement, perte totale du sommeil... (en préciser la forme)

INSTABILITÉ AFFECTIVE

Agitation anxieuse, pleurs pour rien, irritable sans raison

INSTABILITÉ MOTRICE

Incapacité à tenir en place quasi permanente nuit et jour, ne peut rester assis.

INTERPRÉTATION

Attribution d'une signification à un fait qui est pathologique si la signification est éronnée

J

JARGONOPHASIE

Utilisation d'un langage incompréhensible
(le plus souvent dû à un trouble neurologique)

L

LABILITÉ ÉMOTIONNELLE

Passage fréquent et rapide d'un état émotionnel
à un autre (par exemple, rire et pleurs)

LAPSUS LINGUAE

substitution d'un mot par un autre.

LANGAGE (LE)

Son dynamisme (de la bradyphémie au mutisme,
de la tachyphémie à la logorrhée)

LOGORRHÉE OU PALILALIE

Parle beaucoup, possible flux continu rendant le discours
parfois incompréhensible

LUDISME

Fait de jouer, par ex : Jeux de mots, slogans, proverbes...
Manie délirante Etat maniaque franc avec des éléments
délirants d'allure persécutive le plus souvent

M

MANIE SURAIGUË

Etat maniaque avec une symptomatologie très intense

MANIÉRISME

Symptôme de la schizophrénie : manifestation motrice ou verbale donnant l'impression d'un comportement artificiel et bizarre

MAQUILLAGE OUTRANCIER

Maquillage inadapté, trop important, d'allure clownesque

MÉGALOMANIE

Idées de grandeur, se sent capable de tout faire

MÉLANCOLIE

Etat dépressif majeur psychotique

MÉRYCISME (LE)

Forme de rumination alimentaire parfois chez le jeune enfant (6 à 36 mois) quelques fois chez l'arriéré profond

MONOCORDE

Perte de la prosodie

MONOÏDÉISME

Fixation sur une idée

MORCELLEMENT

Le morcellement du corps génère une angoisse d'éclatement avec un sentiment d'anéantissement et de mort. On parle d'angoisse de morcellement.

MUCITATION (LA)

Le patient marmonne des phrases à voix basse ou remue les lèvres sans prononcer de paroles

MUTACISME

Refus de parler, souvent volontaire

MUTITÉ

Absence d'acquisition ou perte du langage parlé (affection neurologique)

MUTISME

Refus de parler, répondre ...

MYOCLONIE

Contracture de certains muscles totalement involontaire (épilepsie)

N

NARCOLEPSIE « maladie de Gélineau »

Se manifeste par des accès périodiques d'endormissement involontaires et incoercibles.

NÉGATIVISME

Marqué par des attitudes d'opposition hostiles paradoxales : refus de la main tendue, refus de s'asseoir, refus volontaire d'exécuter n'importe quelle consigne, fuite du regard.

NÉOLOGISME

Fabrication d'un mot inexistant

NÉVROSE

Trouble de la personnalité caractérisé par une modification de l'affectivité et de l'émotivité, le patient étant conscient de ses troubles.

NYMPHOMANIE

Hypersexualité féminine compulsive avec recherche continuelle du plaisir

O

OBNUBILATION

Obscurcissement de la conscience, trouble de la vigilance

OBSESSION

Idée, pensée récurrente qui s'impose à l'esprit ayant un caractère « absurde ou ridicule »

OMÉGA MÉLANCOLIQUE

Les traits du visage sont tombants, le front est plissé, le patient présente un masque de tristesse marquée.

P

PALILALIE

Répétition itérative de mots ou de syllabes avec un débit accéléré

PARAGRAMMATISME

L'ordre des mots est inversé d'où une syntaxe anormale

PARAKINÉSIE

Mouvement anormal qui se substitue à un mouvement normal par exemple : balancement

PARALOGISME (faute de raisonnement)

Raisonnement faux bien qu'apparaissant comme logique.

PARAMNÉSIE

Trouble de la mémoire qui se caractérise par un mélange du présent et du passé. Par exemple, fausses reconnaissances dans le Korsakoff

PASSAGE À L'ACTE

Action impulsive correspondant ou non au mode de fonctionnement habituel du sujet

PAUCIMIMIE

Qui a pas ou peu de mimique (inexpressif)

PENSÉE CIRCONSTANCIÉE

Pensée qui se perd dans de nombreux détails inutiles avant d'arriver à l'essentiel

PENSÉE FORCÉE

Pensée parasite qui s'impose au malade

PENSÉE PARALOGIQUE

Pensée erronée faite de bonne foi : par exemple, interprétation erronée à partir d'un fait réel

PERSÉVÉRATION

Répétition d'une réponse inadaptée à une question déjà posée, même reformulée

PERSONNALITÉ

Organisation intellectuelle, affective et volontaire caractérisant l'individualité de chacun.

PERTE DE L'ÉLAN VITAL

Perte du dynamisme

PHOBIE

Crainte irrationnelle angoissante, absurde, d'un objet, d'une personne, d'une situation, ne présentant pas de caractère objectivement dangereux (claustrophobie : peur de lieux clos, agoraphobie : peur des grands espaces publics et de la foule, nosophobie : peur des maladies, éreutophobie : peur de rougir en public, phobie sociale : peur de parler en public.

PICA / SYNDROME DE LA PICA

Absorption prolongée et répétitive de substances impropres à l'alimentation (terre, sel, verglas,...) toujours pathologique au-delà de trois ans dans notre culture

POLYDIPSIE

Consommation inhabituelle exagérée d'eau (par exemple syndrome polydipsique du diabète qui est associé à une polyurie)

POTOMANIE

Exagération de la consommation d'eau de façon permanente

PRESBYOPHRÉNIE

Personne démente se présentant comme élégante et bourgeoise

PROSODIE

Discours de faible tonalité

PROSOPAGNOSIE

Trouble de la reconnaissance des visages, le visage des proches perd de leur familiarité

PROSTRATION

Immobile, figé, ne communiquant pas, parfois en position foetale

R

RAPTUS

Réaction brutale liée à un moment d'angoisse paroxystique, par exemple : « je suis angoissé, je veux sauter par la fenêtre => je me défenestre »

RATIONALISME MORBIDE

Raisonnement illogique tentant d'expliquer un événement réel

REPLI

S'isole

RÉTICENCE

Attitude de méfiance se traduisant par le refus volontaire de dire et d'exprimer ses idées, sa pensée

REVIVISCENCE (d'une situation)

Se voit dans les états post-traumatiques (revivre psychiquement un événement douloureux passé)

RIRE IMMOTIVÉ

Rire ou sourire inadapté sans motif en inadéquation avec la situation et le climat (traduit la discordance et la dissociation)

RITUEL

Accomplissement d'un rite, ayant une fonction conjuratoire (supprimer l'angoisse) par exemple, lavage des mains

S

SATYRIASIS

Hypersexualité masculine compulsive avec recherche continuelle du plaisir

SCHIZOPHASIE

Langage hermétique (incompréhensible) qui caractérise un syndrome dissociatif

SOLILOQUE

Parler seul

SOMNAMBULISME

Automatisme déambulatoire durant le sommeil

SOMNILOQUIE

Automatisme verbale durant la nuit

SOMNOLENCE

En demi-sommeil, être assoupi

SOMNOLENCE DIURNE

Dort durant la journée (inversement du cycle sommeil/veille (inversion du rythme nyctéméral), hypersomnie non réparatrice)

STÉRÉOTYPIE GESTUELLE OU VERBALE

Répétition non adaptée automatique d'un geste, d'une attitude ou d'une expression verbale

STUPEUR

Forme d'immobilisme, toute activité motrice, geste/langage, est suspendue

SUICIDE

Synonyme d'autolyse et de la destruction de soi-même

SYNDROME CATATONIQUE

Rencontrée dans la schizophrénie, se caractérise par une passivité psychomotrice, une catalepsie, aucune initiative motrice, un négativisme, parfois accompagnés d'accès d'agitations paroxystiques courts et brutaux

SYNDROME D'AUTOMATISME MENTAL

Selon De Clérambault caractérisé par l'association de phénomènes psychopathologiques qui entraînent chez le patient la conviction délirante qu'il n'est plus maître de sa volonté (vol, écho de la pensée)

Cette dernière selon lui est contrôlée par une force extérieure qui contrôle toute son activité psychique en dirigeant sa pensée ses perceptions et lui imposant ses actes

SYNDROME D'EKBOM

Délire dermatozoïque caractérisé par la conviction d'être infesté de parasites (se rencontre principalement chez les femmes âgées)

SYNDROME D'INFLUENCE

La pensée, la parole ou le mouvement sont imposés. Par exemple, « on me fait faire, on me fait penser, on me fait dire »

SYNTONE

En accord et en harmonie avec l'ambiance



TACHYPSYCHIE

Accélération pathologique du cours de la pensée

TERREURS NOCTURNES

L'enfant s'assoit dans son lit en criant, anxieux et angoissé, mais sans se réveiller (il n'en garde aucun souvenir le lendemain et il est quasi impossible de le calmer par une action extérieure)

THYMIE (ou euthymie)

Humeur normale

TIC

Mouvement bref involontaire et fréquemment répété, intensifié par le stress et l'angoisse (La « maladie gilles de la tourette » associe des tics moteurs et vocaux)

TIMIDITÉ

Réaction émotive lors de contact sociaux (manque d'aisance avec sentiment d'inconfort en société)

TOC

Trouble Obsessionnel Compulsif associant des éléments obsessionnels, compulsifs et des rituels

TRISMUS

Contraction permanente involontaire des muscles de la mâchoire

TRISTESSE

« Baisse » de l'humeur

TROUBLES DE L'ATTENTION ET DE LA CONCENTRATION

Génère artificiellement un trouble de la mémoire antérograde



VAGINISME

Contracture musculaire des muscles vaginaux rendant difficile la pénétration

VÉCU DISSOCIATIF

Sentiment de la perte de son intégrité corporelle

VERBIGÉRATION

Répétition désordonnée de mots n'ayant aucun sens rendant le langage incohérent

VERSATILITÉ DE L'HUMEUR

Humeur labile qui passe du rire aux larmes

Edition

Délégation communication EPS de Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès 93332
Neuilly-sur-Marne CEDEX
communication@epsve.fr
2ème édition format poche décembre 2016

Rédaction

Elodie Deline *infirmière*

Patrick Richardson *cadre de santé*

Remerciements

pour les relectures

Nadine Chastagnol, *coordonnatrice générale des soins*

Dr Laurent Vassal, *psychiatre chef de pôle,*

président de la commission médicale d'établissement

Collègues de l'établissement

Graphisme et illustrations

Laurence Lefèvre Manolau

Impression

??

EPS Ville-Evrard
202, avenue Jean Jaurès
93330 Neuilly-sur-Marne
Standard : 01 43 09 30 30
www.eps-ville-evrard.fr